

串

雅

串雅內編卷二

錢塘趙學敏恕軒纂

截藥

外治門

散毒仙丹

治瘡瘍

銀花<sub>二</sub>生甘草<sub>一</sub>當歸<sub>一</sub>黃芩<sub>一</sub>錢蒲公英<sub>一</sub>乳香

錢<sub>一</sub>

右為末先將前藥用水五碗將乳香末調飲之神效

消毒散

治癰疽瘰癧毒及初生多骨疽

大黃

兩一

芙蓉叶

晒乾

末一兩

麝香

分二

冰片

分二

五倍子

兩一

兩一

藤黃

錢三

生礬

錢一

錢一

右為末米醋調成如厚糊塗于多骨疽之四週中

留一頭如豆大以醋用鷲翎不時掃之若不掃任

圍則無益一日夜即內消其餘癰瘰亦以此敷之

神效

陰陽黃

治發背癰疽疔瘡惡瘰一切無名惡瘡腫

毒焮熱疼痛初起未潰者

錦紋大黃不拘多少一半水甘草節分為細末每

服一匙空心溫酒調下一二服疏利為度

五毒丹 創于瘍藥公孫知點一切癰疽無不神效

丹砂養血雄黃補脾礬石理脂膏磁石通腎液

膽治肝

石藥各等分入陽城礬鹽泥固濟昇煉取飛霜枚

用

發背膏藥 此方甚奇以千金得之用無不效

滴乳香四兩若色燒淨沒藥照前式去鮮油血竭

赤磚壓去油外治

二

白色兒茶四兩上好銀硃四兩杭州定粉四兩上好黃

丹四兩上銅綠錢三

篩

以上俱各另礱無聲爲極細末共一處臨時照患  
大小夾連四油紙一塊以針多刺小孔每張稱藥  
末五錢用真正麻油調攤紙上再用油紙一塊蓋  
上周圍用線將二紙合縫一處貼患上用軟絹紮  
緊自然止痛化腐生新過三日將膏藥翻過用針  
照前多刺小孔貼之因藥品甚貴取其又得一面  
之藥力也無火之人內服十全大補湯有火之人

減去肉桂薑棗煎服兼以飲食滋補無不取效至  
重者用膏二張百無一失

大黑虎膏 癰疽發背跌撲損傷折骨疔瘡並皆治

之

白芷 大黃 黃連 白芨 白歛 黃芩 木

鬘 黃柏 羌活 獨活 金毛狗脊 杏仁

當歸 芍藥 川芎 肉蓯蓉 生地 前胡

柴胡 肉桂 荊芥穗 黃芪 連翹 防風

草麻子 各一兩 乳香 沒藥 血竭 各一兩 樟腦 血

餘各四香油斤三飛丹斤一麝香錢三槐柳枝兩各二  
右乳香等細藥另研聽用餘藥入油熬黑枯色濾  
去渣再熬滴水不散入飛丹以槐枝不住手攪入  
水和軟不斷不粘住火入乳沒血竭三味次入樟  
腦麝香攪勻收用攤貼

一筆消

雄黃兩二麝香錢三藤黃兩一八中白錢五硃砂錢二蟾酥兩一  
白芨錢二生白蘞錢二共研末用廣膠二錢烱化和藥  
末為錠遇毒用此藥磨醋水塗之

移毒方 凡毒在緊要處移在閒處底不傷命

地龍裝在絰霜然衣內煨焦入麝香分乳香 沒

藥各五雄黃錢一蟾酥分黃蠟兩共為末蠟丸每服

三分上部要處甘草麻黃桂枝煎酒下即移在左

手上而散如在背上羌活防風姜煎湯下移在臂

上如下部木瓜牛膝靈仙陳皮獨活姜煎湯移在

足下神效

太提藥方 用敷初起對口發背惡疽四五日即消

雄黃 藤黃 真當門子 錢各一 硃砂分三草麻子肉



錢紅昇藥五錢如用一錢則為緩難效 先將草  
蘇子研如泥後和各藥研爛用象牙匣封藏外用  
虎皮包好則不泄氣

黃提藥方 治一切惡毒未成可消已成用之化腐

疔毒更妙

麝香 雄黃各一半黃 蟾酥 硃砂 麝香  
冰片各五巴豆肉錢草蘇肉各研末搗磁遇症放  
膏藥上少許貼之

白靈藥

蘆甘石一兩黃連一錢黃柏一錢黃芩各二錢將甘石放銀  
罐內燒紅收汁約九次以甘石酥為度晒乾研細  
加水片五分治口碎點眼甚妙加珠子少許治下  
疳可生肌長肉凡有熱毒配三白昇藥人乳調敷  
立愈

### 紅昇藥 名五靈昇藥

水銀

白礬

各五錢

硃砂

雄黃

各二錢五分

火硝

八錢

照昇藥法昇之凡一切無名腫毒如潰久內敗四  
邊紫色黯色將靈藥水調研細以雞毛掃于黯肉

上立刻紅活死肉脫去再上生肌散即收功凡通  
腸痔漏將此藥以紙捲成條插入管內七日其管  
即隨藥條脫去

白降丹 石夏水對配丹

水銀

淨火硝

白礬

皂礬

炒白鹽

各九錢

煉

法將藥共研至不見水銀星盛于新大傾銀罐內  
以微火溶化大急則水銀上昇走爐須用煇炭為  
妙熬至罐內無白烟起再以竹木枝撥之無藥屑  
撥起為度則藥吸于罐底謂之結胎成用大水盥

一个盛水、盆内置淨鉄火盆一个以木盆内水  
及鉄盆之半腰為度然後將前結就之胎連罐度  
于鉄盆内之居中以鹽水和黄土封固罐口勿令  
出氣出氣即走炉將用淨水灰鋪于鉄盆内灰及  
罐腰將灰按平不可按動药罐恐傷封口即要走  
炉鋪灰畢取燒紅栗炭攢團罐底用扇微扇煉一  
炷香謂之文火再畧重扇一炷香謂之武火炭隨  
少隨添弗令間断而見罐底再煉一炷香即退火  
待次日盆灰冷定用帚掃去盆灰并将封口土去

淨開看鉄盆內所有白霜即謂之丹將磁瓶收貯  
待用愈陳愈妙其罐內原胎所糝癰瘡神效若恐  
胎結不老罐裏盆內一遇火煉胎落鉄盆便無丹  
降亦為走炉法用鉄熬作一三脚小架頂炉內撐  
往丹胎最為穩要此丹如遇癰疽發背疔毒一切  
惡瘡用一厘許以津唾調點毒頂上以膏藥蓋之  
次日毒根盡拔于毒頂上結成黑肉一塊三四日  
即脫落再用紅昇藥數次即收功  
此丹用蒸粉糕以水少潤共和極勻為細條晒乾

收竹筒內名為錠子凡毒成管即約量管之深淺  
插入錠子上蓋膏藥次日擠膿如此一二次其管  
即化為膿管盡再上昇藥數次即收功矣此丹比  
昇丹功速十倍但性最烈點毒甚痛法用生半夏  
對攪再加冰片少許能令肉麻不痛

五寶霜 治癰疽楊梅諸瘡

水銀一兩 硃砂

雄黃各二錢半 白礬

綠礬各二兩半 研勻

勻碓盛灯盞蓋定鹽泥固濟文武火煉升罐口掃  
收每以三錢入乳香沒藥各五分洒太乙膏上貼

之絕效

四金剛

治無名腫毒

銀花

兩一

生甘草

錢二

當歸

錢八

黃芪

錢五

用水

一碗

陳酒

一

碗合煎

空心服

五虎下西川

治無名腫毒癰疽發背等症三日即

愈神方

川山甲

炙

白芷

黃芪

當歸

生地

錢各三

黃酒

二碗或酒水各半煎一碗服在頭面上者加川芎

五錢身體中者加杜仲五錢在兩腿者加牛膝五

錢在肢臂手足者加桂枝五錢

離宮錠 治無名腫毒

蟾酥

血竭

膽礬

硃砂

各三錢

京墨

一兩

麝香

一錢

五分各研末和勻入糊研極勻作筋粗寸長錠晒乾

清茶研敷

坎宮錠 治一切赤熱腫痛并痔漏諸毒用冷水磨

如墨以筆掃藥塗之立愈

京墨

熊膽

胡連

兒茶

牛黃

各三錢

冰片

一錢

麝香

五錢

研末用猪膽汁加生薑大黃水浸取汁釀



醋各少許相對和藥為錠

鐵井闌 治癰疽腫毒

重陽前芙蓉葉研末端午前蒼耳燒存性研末等  
分蜜水調塗四圍其毒自不走散故名鐵井闌

代刀膏

桑木灰錢七礪子灰錢五蕎麥楷灰 茄科灰各一兩放  
鍋內水五碗滾十數次用布袋濾去渣將水從新  
用鐵杓熬一小杯存用如腫毒數日內有膿不得  
自破其頭如瘡大者將此藥在頭上畫一十字即

出膿諸般大瘡有疔角腐肉不脫者用此藥水洗  
之即去又點面上黑痣雀斑神效

生肌散 名海龍粉

龍骨 血竭 紅粉霜 乳香 沒藥 海螵蛸

赤石脂 各一分 煨石膏 二分 為末敷上極效

大凡生肌散內要配紅粉霜若要去腐肉每一兩  
配入粉霜或三分五分如治下疳等瘡每兩配一  
二分

開刀麻藥

川烏

草烏

半夏

生南星

蟾酥

錢各一

番木

蟹

白芷

牙皂各三

共為末臨時水調敷一飯

方開刀不疼

換皮麻藥

凡

欲

去皮之

瘡癬

先服

此藥

使其

不知然

後開刀糝生肌藥

羊躑躅

錢三

茉莉花根

錢當歸

兩一

菖蒲

分三

水煎

服一

碗即入如睡寢任人刀割不痛不瘡換皮後五日

以人參五錢生甘草三錢陳皮五分半夏一錢白

微一錢菖蒲五分茯苓五錢煎服即醒

生肌散 兼治割痛敷之生皮凡去皮後敷藥末五

錢不但能作瘡更奇

人參錢一三七根末錢三輕粉分五麒麟血竭錢三象皮錢一

乳香一錢沒藥一錢油千年石灰錢三廣木香末錢一冰

片三分兒茶錢二

各為極細末研無聲為度脣合須用端午日不可

使一人見之

瘰癧毒 凡人瘰癧發于背或生于頭頂或生于胸腹

或生于手足臂腿腰臍之間前陰囊門之際無論

陽毒陰毒一服立消已潰者即飲

金銀花四兩蒲公英一兩當歸三兩元參一兩水五碗煎八分肌服一劑盡化為無有矣切弗嫌其藥料之重減去分兩則功亦減半矣

決膿妙法 治瘰癧不出

人乳汁和麪敷之比曉膿盡出不可近手

立消散 治便毒瘰癧腫如神

金蠅炒核桃去殼肉只用隔膜炒等分為末空心酒調下三錢午再服三日全愈

靈異膏 治患毒疽不愈者以此貼之即愈勿用鐵

鍋煎

防風 梔子 黃芩 當歸 生地 甘草 苦

參 銀花 大黃 赤芍 黃柏 連翹 荆芥

海風藤 白蒺藜 槐枝各二兩 何首烏忌 牛蒡

子 白芷 杏仁 地榆各一兩 木通 山豆根

川芎 蒼朮 獨活 羌活 蜂房 蟬蛻 僵

蠶 白朮 白薇 麻黃 丹皮各五錢 乳香二兩 沒

藥 血竭 兒茶 蜈蚣 龍骨各一兩 赤石脂二兩

麝香二錢樟腦 輕粉 黃蠟 白蠟各五錢 黃丹飛水

過淨三斤

麻油六斤浸藥七日入亂髮三兩熬焦黑色髮化盡去渣再熬滴成珠下丹收膏停火下乳香等藥再候少溫下麝香輕粉黃蠟白蠟溶化入水中出火毒斃瓶收用

千里光膏 貼瘡癰風癰楊梅瘡毒驚掌風極效

千里光 採莖葉搗汁砂 防風 荊芥 黃柏 金

銅內熬成膏

銀花 當歸 生地 各二 川椒 白芷 大黃

紅花各一兩  
苦參四兩

麻油浸三日熬枯黑色去滓每油二碗配千里光膏一碗再熬滴水成珠飛丹收成膏入乳香沒藥各一兩輕粉三錢槐枝攪勻收用

萬寶代鍼膏 治諸惡瘡核赤暈已成膿不肯用鍼以此藥代之但用小針點破瘡頭貼上膏藥膿即自潰

蓬砂 血竭 輕粉 各一錢半  
金頭蜈蚣 一個  
蟾酥 五分  
雄黃 錢一分  
冰片 少許  
為細末用蜜和成膏看瘡有



頭處用小針挑破以藥少許放紙上封貼早次其  
膿自出如腋下有毒孩兒名暗疔瘡或有走核可  
於腫處用針挑破如前用之忌雞羊酒麪等物吃  
白粥三日為妙

又方

用磨刀泥白丁香麝香巴霜火上燒灰研細過一切腫  
毒津唾和搽少許一週時其頭即破

吹消散

乳香 麝香 蟾酥 辰砂 兒茶 沒藥各等

分研極細末用一分彈封膏上貼之立消腫毒  
護心散 又名內托散乳香萬金散凡有疽疾一日  
至三日之內宜連進十餘服方免變症使毒氣不  
出外稍遲毒氣內攻漸生嘔吐或鼻生瘡菌不食  
即危矣四五日後亦宜間服之

萊豆粉兩乳香兩燈心同研和勻以生甘草濃煎  
湯調下一錢時時呷之若毒氣沖心有嘔逆之症  
大宜服此蓋萊豆蠶熱下氣消腫解毒乳香消諸  
瘻腫毒服至一兩則香穢瘡孔中真聖藥也

透骨丹 治跌撲損傷深入骨髓或隱、疼痛或天  
陰則痛或年遠四肢沉重無力此藥主之真神方  
也

開楊花子

一兩火酒浸炒三次  
童便浸二次焙乾

乳香

沒藥

不去油

真血竭

各三錢

為末

研勻

再加麝香

一分

同研

磁瓶

收貯封固

每服

三分

壯者

五六分

不必用

夜飯

須

睡好方服

酒可盡量

下服

後避風

有微汗

出為要

忌房事酸寒茶醋等

弱者

間五日

一服

壯者

間

三日一服

醉仙散 治癰風

胡麻仁 牛蒡子 枸杞子 炒各五錢 蔓荊子 炒防

風 水菱根 白蒺藜 苦參 錢各五

右為末每一兩半入輕粉二錢拌勻大人用二錢  
空心日午臨卧各服茶湯調下服後五日間先于  
牙縫內出臭涎水渾身覺疼昏悶如醉利下臭屎  
為度量大小虛實加減與之證候重而急者須先  
以丹造散下之候補養得完復與此藥服須斷鹽  
醬醋諸般肉魚腥椒料水果煨燒炙烤及茄子等

物只宜淡粥熟煮時菜食之或烏梢菜花蛇用淡  
酒煮熟食之以助力可也

# 再造散 治癘風

錦紋大黃一兩皂角刺一兩半獨生鬱金五錢白牽牛

頭末六錢  
半生半熟

右為末每服二錢臨卧冷酒調服一云日未出面  
東服以淨桶伺候泄出虫如虫口黑色乃是遠年  
赤色是謂之近三四日又進一服直候無虫則絕  
根矣後用通聖散調理可用三棱針刺委中出血

終身不得食牛馬驢驘等肉大忌房事犯者必不  
救

### 大麻風

活穿山甲一個揀最大者用生桐油一斤如小者  
桐油半斤加雄黃末一錢沒藥末七分黃柏末一  
兩共攪入生桐油使勻將穿山甲架起下用炭火  
熏令其口渴口有張開將藥末和藥油灌入口內  
不喫再烘儘油吃完為度再加大火將穿山甲炙  
酥研為末另加百草霜一兩共研細收入瓷瓶內

封緊不可洩氣凡遇麻瘋之人每用五錢用燒酒  
調服上用棉被重蓋卧一時餘候汗出滿身其蟲  
隨汗而出隔一日再服五錢照前服卧出汗即將  
病人著蓋衣服被褥等併盡行換過送至無人處  
所掘坑焚燒人不可近恐染此症服後七八日身  
面加蛇殼蛇皮永不再發真仙方也

秘煉楊梅瘡藥

辰砂

雄黃

鹽

白礬

炒

綠礬

炒

焰硝

各一

兩

一

研

砂五錢

右為末入陽城罐封固水火升打一炷香取出冷  
定開罐將升盞者搥下用磁瓶貯之黃蠟封口入  
井內三日取出每藥二分半配槐花硃砂褐色者  
一兩飯丸桐子大每服十丸神效罐底渣可合瘡  
瘡藥

封罐口神膠 破沙罐末 草鞋灰 黃泥 傾

銀罐末 燒鹽 各一為極細末用鹽酒調和如

膠丹入乳鉢內搗細用紙子挑封罐口

乳香飲 治折傷損腰神驗

外治

六



酒浸虎骨敗龜版黃芪牛膝車薺續斷乳香各等  
分煎服

取疔膏

乳香一粒麝香一米粒黃連末 連翹末 桃仁二個

同蝦蟇肝腸肺三味共一處入乳鉢內搗如泥白

皮紙一小刀攤貼患處三四日連疔揭去

聚疔毒

鉄繡不拘多少研為末醋調塗毒上須臾毒自出  
出并治瘡癰膿水不乾及難收口者即效

消疔

人指甲灸為末放患處將核桃平破取肉嚼爛安半殼內合住不可露氣一飯頃即消

瘰癧奇方

亦可消瘤去瘰

石灰

半斤細末

研大黃

四兩同入鍋內炒通紅

又將洗

碱四兩

和水四五碗

枇杷葉七片共煮水乾至一

半入前石灰攪勻再煮水將乾聽用又以蛇含石

二兩醋煨七次為末又以芫花五錢漸加入攪

勻成膏每膏一兩加蟾酥麝香各二分為丸胡椒

大未破者將一九粘核上其丸自入以淡猪肉湯洗過又粘又洗如此三次其核自動將皮搨開以銀鈎取出核即貼生肌膏

### 生肌膏

麻油一斤化胎髮一團熟滴水成珠龍骨煨黃占熟猪油赤

石脂乳香沒藥輕粉象皮煨各一錢入

油內攪勻成膏攤貼一日一換仍以猪肉湯洗三

四次即平半月收口取核時先服提氣湯

### 提氣湯

人參 白芷 生地 龍膽草 川芎 升麻  
柴胡 乳香 甘草 貝母 橘紅 香附 桔  
梗各等分姜棗水煎服

三妙散 治結核瘰癧遍滿脖項神驗此方雖平易  
實屢試屢驗

夏枯草 金銀花 蒲公英 各五錢  
水酒各半煎服  
多用極驗

消瘰癧痰毒 未穿破者為痰核已破者為瘰癧三  
五個連者為痰串用羊角數對威靈仙四兩共入

瓦罐內加清水煮數沸候角軟取出切薄片用新  
瓦燒紅將角鋪上焙燥過研細每灰一兩加廣木  
香一錢白芥子三錢共為末煉蜜為丸用枳櫛煎  
湯下或夏枯草湯下亦可服至七日後大便下如  
黑羊屎小便出黑水自消婦人如爛開兩脇服之  
亦效忌生冷煎炒房事

提癭丹

取痰核

水銀

硼砂

火硝

明礬

皂礬

食鹽

錢各一

硃砂  
錢二

用粗瓦盆放前藥上合粗碗一隻鹽泥封固炭火  
煉三炷香先文後武冷定取出昇在粗碗上藥白  
米飯搗丸菜豆大硃砂為衣每用一丸放瘡上棉  
紙封二三層一日夜急揭起則核隨紙帶出丸可  
再用

神授五公散

治漏孔并諸瘡眼久不斂者痔瘡亦

效

大五倍子一個蜈蚣一條去  
濕紙包存性煨為末先以葱湯洗瘡淨糝前藥并

用膏藥貼之每日一換即飲口如神

三品錠子

上品錠子 專治痔漏一十八症

紅礬二錢乳香 沒藥 硃砂去鐵各半黃分五

半硃砂一分錢四分七白信火一兩

中品錠子 專治翻花瘰癧等痔

白礬二兩八錢五分乳香 沒藥各五錢硃砂五錢牛黃

四分硃砂一分錢半金信一兩五錢以火煨盡

下品錠子 專治疔瘡發背等症

研

紅礬 三兩 二錢 乳香 六錢 沒藥 五錢 硃砂 三錢 牛黃 四分 硃砂 二錢 白信 三兩 火煨 黑烟盡 各依法製  
用麪糊和勻熬成錠子看痔漏大小深淺插入  
錠子如肉內黑色勿上生肌散只待黑肉落盡  
方可上若瘡無頭太乙膏一个加後藥一粒貼

之

白礬 二兩 乳香 三錢 硃砂 四分 牛黃 五分 沒藥 三錢 薑  
黃 二錢 白丁香 一錢 巴豆 三錢 草絲 五分 為末或  
唾沫調敷瘡一日三次但瘡破插上前錠子



破癭點藥

水銀錢一 硼砂錢一 輕粉錢一 鵲糞錢一 鷺糞錢一 冰片分五 朝  
腦分五 綠礬錢一 皂礬錢一 麝香分三 為細末用針刺一小  
孔然後乘其出血之時將藥點上則粘連矣約一  
分用以人乳調之點上大如芡實一日點三次第  
二日必然流水流水之時不可再點、則遇疼轉  
難收口矣一日後必然水流盡而皮寬如袋後用  
煎方自然平復如故

煎方 人參錢三 茯苓錢五 薏苡一 澤瀉錢二 猪苓錢一 黃芪

一白芍錢五生甘草錢一陳皮錢一山藥錢三水煎服十劑  
全消如故但忌房事一月餘無所忌若犯房事必  
破不能收口終身成漏矣

癰疽拔膿 此方甚奇頑瘡可用

癰疽不破或破而腫硬無膿用班蝥為末以蒜搗  
膏和水一豆大許貼之少須膿出即去藥

### 治火丹

絲瓜子錢一紫胡錢一元參錢一升麻錢一當歸錢五水煎服  
一劑即消

治瘡二法

頭面上瘡用銀花二兩當歸一兩川芎五錢蒲公英三錢生甘草五錢桔梗三錢黃芩一錢水煎服一劑輕二劑全消不必三劑

身上手足瘡用銀花三兩當歸一兩生甘草三錢蒲公英三錢牛蒡子二錢芙蓉葉七個無葉用梗三錢天

花粉五錢水煎服一劑即消二劑全愈

擦瘡成水 人有病手足生瘡變成大塊不必刀割只用小刀畧去其皮一分以此藥敷之即化為水

人參錢三甘草錢一硼砂分一冰片分一輕粉厘五各為末  
之即化為水矣人更有肚上生瘡結成頑塊終年  
不去者亦可治之立效

掃疥 治諸疥瘡熱瘡遍身癩瘡神效

大黃 蛇牀子 黃連 黃柏 狗脊 苦參各五

錢為末入硫黃水銀茶末殺之雄黃 黃丹各二

輕粉錢一大楓子殼去木鱉子殼去各五錢同煎藥細末

杵勻用猪脂調洗浴後搽瘡上此藥宜晒合之不

見火塗瘡亦立效

七製松香膏

治濕氣第一神方

松香 第三斤 七製第一次用姜汁煮第二次葱汁煮

開楊花汁煮第六次商陸 桐油 三斤 川烏 草烏

根汁煮第七次紅醋煮

白芥子 草麻子 乾薑 官桂 蒼木 各四兩 血

餘八共入桐油熬至藥枯髮消滴水成珠瀝去渣

入牛皮膠四兩烱化用前製過松香漸々加入收

之離火加樟腦一兩好麝香三錢用厚紙攤之貼

患處

諸瘡藥

治天泡瘡更效

煨熟石膏兩一 松香 白芷錢各三 樟腦錢二 輕粉分五 冰片分一 為細末 熬熟猪油調搽

破棺丹 治瘡氣入腹危者

大黃生二兩半 熟甘草 芒硝各一兩 為細末 蜜丸彈子

子大每服半丸 食後溫酒化下 或童便半盞研化之 忌生冷水

一掃光 治疥瘡及婦人陰蝕瘡 漆瘡 疔丹 諸惡

瘡神效

蛇床子

苦參

蕪荑

各一兩

雄黃

錢五

雄精

錢一兩

硫

外治

三

黃輕粉 樟腦錢各二 大楓子內取川椒錢各五為末

生猪油調敷

又方

蛇床子 硫黃 黃柏各一 大楓子 川椒 雄

黃錢五 枯礬二 輕粉二 另研入 牛皮岸 薰牛皮烟岸

代三黃丹各一為末生猪油調敷

又諸般疥瘡加減法 腫多加白芷開聲 痛多加

白芷鮮石 痒多加枯礬 陰囊瘡加吳茱萸

濕多香油調 乾痒出血加太黃、連猪油調

蟲多加蕪荑錫灰楨榔梨蘆斑蝥 紅色加黃丹

青色加青黛

小金絲膏 治一切疥癬毒

瀝青

白膠香

各二兩

乳香

錢二

沒藥

一兩

黃蠟

錢三

又以

香油

錢三同熬至滴水不散

傾入水中扯干遍收貯

每捻作餅貼之

截癰

牛皮風癰

川槿皮

一兩 仁十五

半夏

錢五

河井水各一盞浸

露七宿入輕粉一錢入水中禿筆掃塗覆以青衣



數日有臭涎出妙忌浴澡夏月用尤妙

九熏丹

治癬

好銅青

二三兩  
研細

好燒酒拌之須不乾不濕塗于粗

盤底內翻轉合地上以磚墊露一線下以蘄艾熏

之再拌再熏如此几次少亦要七次約以青色帶

黑為度然後再研細將燒酒拌做成錠子用時以

醋磨搽每日三五次五日後若覺乾裂以菜油少

許潤之七日愈

日本國癬藥

愈  
黑沙糖四兩 臭雄黃三兩 礬石二兩 椒錢五兩 燒酒一 調搽立

### 枯瘤散

灰莧菜晒乾燒灰半碗 蒿麥半碗 燒灰風化石灰 淋一 碗和 處  
漫火熬成霜取下配 番木鱉三 擗去油 巴豆六 粒去  
油胡椒十九粒 明雄黃錢一 錢入前藥 和勻  
以磁瓶收貯不可見風以滴醋調勻用新羊毛筆  
蘸藥點痛上瘡有碗大則點如龍眼核大若茶杯  
大則點如黃豆大乾則類點之其瘤乾枯自落如

血瘤破以髮灰糝之粉瘤破以白麻皮燒灰糝之  
外以膏護好自能飲口收功

飲痛膏

治癭瘤枯落後用此搽貼生肌收口

海螵蛸

血竭

輕粉

龍骨

象皮

乳香各

錢

雞蛋

五個煮熟用黃  
熟油一小鐘

右各

研細末將蛋油調勻

用甘艸湯洗淨患處以

雞毛掃敷再將膏藥貼之

治痛

水銀錢一  
兒茶錢三  
冰片公三  
硼砂錢一  
麝香公三  
血竭錢三  
各

為細末將此藥擦于瘤上之根處隨擦隨落根小者無不落也

### 治流火方

鮮紫蘇 鮮鳳仙花 二味洗淨連根葉搗爛放水盆內以滾水沖入將腳架盆上熏至可洗以軟綿洗之立愈數十年者不過洗三四次不發矣

### 取痣餅藥

糯米粒百 石灰大指 巴豆粒三 去殼研為末入磁餅同  
審三日每以竹筴挑粟許點上自落

點痣藥 一切痣疣及瘰癧由雞眼

桑柴灰

風化石灰

各一斤

鮮威靈仙

六兩

煎濃汁淋

二灰取汁熬成稀膏磁器收貯用點患處不必挑

破應手而除

點黑痣

杏子仁為末雞蛋清調點一宿自落

治膝瘡

先將綿紙看瘡大小裁成塊十二張四角以紙撚釘住聽用麻油二兩川椒四十九粒入銅杓內煎

黑色取起次入槐枝一寸長者四十九根再煎枯  
黑取起次入黃蠟一兩并研細輕粉三分枯礬一  
錢候溶化即以前熬入油內少煎即起但令油透  
透勿使紙焦黃貼時先將槐枝蔥椒煎湯洗瘡用  
絹拭淨後將所製紙齊齊貼之面用油帛蓋一張  
外用紅絹繫縛每週時去紙一張待紙取盡則瘡  
自愈矣

### 透骨丹

蟾酥

硼砂

輕粉

巴豆

錢冬三

蝟牛

二麝香分

先將藥研細後入已竭耳礮礮收貯每用少許  
乳汁化開將瘡頭輕、擦破挑藥如米許大納于  
瘡口外以膏藥蓋之

勝金丹 治跌打損傷神效

血竭

乳香

沒藥

各三

地龍

條十

自然銅

兩一

無名

果錢木

煎子

為五

末煉

蜜為

丸如

彈子

大臨

用好酒

化下一丸如不打用紅花蘇木煎湯服即解

松肉葱白膏

治杖瘡

猪肉

不精

不肥

二

加葱

白

要一

再加

明松

香三

兩研

極細末以節節、過方可連蔥放在肉內斬為極細  
攤敷患處以布脚帶紮緊不可寬至週時皮肉還  
原與不打無異牀上忌放壇皮等物須切記若膿  
血水任其流放不妨

小金蓮 女兒纏脚方也

乳香

沒藥

各去油一錢

草麻仁炒 川馬

草烏

各五錢

共研為細末將肥皂

二十個去弦及內外筋膜

同藥搗極爛治

婦人金蓮敷在足骨上過一夜次日洗去足軟如

綿



搗傷

指上搗過有凹痕用銀硃和酒磨濃依痕圈之自復

整骨麻藥

草烏

錢三當歸

白芷

錢各二

為末每服五分熱酒調

下麻倒不知痛然後用手如法整理

截骨神方

川山甲

一兩虎骨

三兩銀香

去壳

大棗

去核

如人傷只

好服三錢六分用細酒沖服

天下第一金瘡藥 凡刀斧損傷跌扑打碎敷上即時止痛止血更不作膿勝于它藥多矣其傷處不可見水

公猪油一斤 松香六兩 面粉四兩 麝香六分 黃蠟六兩 樟腦三兩 冰片六分 血竭一兩 兒茶一兩 乳香一兩 薄荷皮一兩 沒藥一兩 全上製

以上藥研極細先將猪油松香黃蠟三味熬化濾去渣待冷再入藥末攪勻磁器收貯不可洩氣接骨至神丹 治跌傷打傷手足斷折急以杉板夾

住手足扶正湊合再用此藥

羊躑躅

三錢炒黃

大黃

三錢當歸

芍藥

丹皮

各三錢

生

地

五錢土狗

十個

土

五錢搗爛

先將前藥酒煎然後

入自然銅末一錢調服連湯吞之一夜生合神效不必再服止服二劑可也

陰囊爛盡

止留二子者

鳳仙花子甘草等分為末麻油調敷即便生肉

美首膏

治小兒白虎癩瘡

百草霜

一兩

雄黃

一兩

膽礬

六錢

輕粉

一錢

榆樹皮

三錢

用石

灰窰內燒紅流結主渣四兩共為細末猪膽汁調  
剃頭後搽之神方也

手足皸裂

大蘿卜仁內雕空放入柏油錢安爐火上煨熟候  
冷取油擦患處即愈

治陰蝕

蚯蚓三四條炙乾為末葱數條火上蜜一碗煮將藥搗于  
其中納入陰戶蟲盡死矣

治體氣方

田螺大者已去壳一粒碎一胆礬許一麝香少許研將

螺用水養三日去泥土揭起蝶鱗入礬豆麝香末在

內以線拴住置磁器中次日化成水五更時將藥

水以手自抹兩腋下不住手抹直待腹內欲行却

俟手先擇深遠無人空地內去大便黑糞極臭是

其驗也以上蓋之勿令人知不盡再抹藥水又去

大便次用白礬一錢蛤粉五錢樟腦一錢為末搽之永

絕病根

痘後生翳

水銀錢一號丹錢五所春作六九甘錫糊定火煨一日  
取出薄綿裹之左翳塞右耳右翳塞左耳自能墜  
下

免喉内生哦

喉中畧痛即用燈草一把煎湯沙糖調飲一日即  
止痛立愈

串雅內編卷三

錢塘趙學敏恕軒纂

截藥

雜治門

取牙鯽魚霜

大鯽魚一個去腸入砒在內露乾放陰地待有霜刮下瓶收以鍼搜開牙根點少許咳嗽自落或以少許藥置膏藥上貼蛀牙上粘之即落

又方

雜治

活雄鯽魚一尾約四五兩白砒六錢將砒末入魚腹中待肉爛去砒不用只用淨魚膏晒乾為末每用米糲大小許故患牙根上自落

取箭鏃方

用天水牛一个獨角小者以小瓶盛之礪砂一錢研細用水些少滴在內浸自然化水以藥水滴傷處箭頭自出

黑鬚倒捲簾

大馬琪二三十條竹筒裝之夜置露處受氣餓過



七日以雞冠血磨京墨與食過四五次復陰乾將猪脰骨打断放罏入內仍合定鐵線纏住鹽泥塗之乾時放地上火煨五寸香二次退開三寸火又放五寸香三次再退遠火又五寸香取出為末將猪膽皮色指承末搽鬚稍即倒上也

### 黑鬚仙丹

熟地斤一萬年青三片小桑椹斤一黑芝蔴八兩山藥斤一南燭皮四兩花椒一兩白果一兩巨勝子三兩連壳蜜丸早晚酒送下各五錢忌食蘿蔔

又方

熟地一斤 薏仁

山茱萸

桑葉各八兩

白朮

生赤

何首烏

各三兩

巨勝子

白果

各三兩

黑芝麻

四兩

山藥

一花柳

一兩

烏頭皮

四兩

胡桃肉

三兩

加參片

三兩亦可

無蜜

丸每服五錢

取輕粉毒

出山黑鉛

五斤打

盛燒酒

十五斤

納土茯苓

半斤乳香

錢封固重湯煮

一日

夜埋土中

出火毒

每日早晚

任性飲數杯後用瓦盆接小便自有粉出為驗服

主筋骨不痛乃止

受打不痛

用血管鷲毛七根地龍七條煨過用煨乳香同白  
蚶為末好酒送下

悅容丹

白瓜仁五兩桃花四兩白楊皮二兩為末食後飲服一匕  
每日三服欲白加白瓜仁欲紅加桃花三十日面  
白五十日手足俱白一方用橘皮無楊皮  
面黑令白

真女苑分三鉛丹分一為末醋漿服一刀圭日三服十日大便黑十八日面如漆二十日全白便止過此則大白矣三十後不可服忌五辛

### 誤吞鐵石

王不留行黃柏等分為末湯浸蒸餅丸彈子大青黛為衣線穿挂風處用一丸水化灌之

### 脚城繭

葱根芋薺搗汁一碗再取松香四兩麻油再煎滴水成珠方入前汁推膏藥貼即落

足趾雞眼

作痛作癢地骨皮同紅花研細敷之次日即愈

截毛蟲傷

春夏月樹下牆塹間雜色毛蟲極毒人觸著者則放毛入人手足上自皮至肉自肉至骨皮肉微痒以漸至痛經數日痒在外而痛在內用手抓搔或痒或痛必至骨肉皆爛有性命之憂此名中射工毒諸藥不效者好豆豉約一碗清油半盞拌豉搗爛厚薄痛痒處經一時久豉氣透骨則引出蟲

毛紛：可見取下豆豉埋土中煎香白芷湯洗痛處如肉已爛烏賊骨為末傅之即愈

又方

鍋底黃土為末以醋捏成團子痒痛處擦轉其毛皆出在土上痛痒立止神效無比

紅玉膏 治女人面脂

輕粉 滑石 杏仁皮去等分為末蒸過入腦麝少許以雞子清調勻洗面畢傅之旬日後如紅玉

竹木刺

鮮蝦黃雀糞共搗罨上即出

治中河鮑毒

大紅降香為末極細以索粉水調服錢許吐出毒物即愈神效

虎傷

被虎齧傷血必大出傷口立時潰爛疼不可當急用猪肉貼之隨貼隨化隨易方單一丹用此藥敷之地榆一斤為末加三七末兩苦參末兩和勻糝之隨濕隨糝血即止痛即定

頂藥

巴霜頂丹溪喉閉丸

治纏喉風喉閉先胸膈氣緊驀然咽喉腫痛手足厥冷氣不能通頃刻不治

雄黃錢鬱金

分五

巴豆

七粒去壳皮

冰麝

各少許

為末

醋和

九如麻子大清茶下五分噤喉塞用竹管納藥入喉中須臾吐痰立解未吐再服

四寶頂狗藥丸

丁丹崖祖師傳治噎膈翻胃



硫黃

水銀

各一錢同炒成金色

狗寶

寶錢三為末雞子去白一枚

留和藥攪勻

紙封泥固煆火煨半日取出研細每

服燒酒調五分不過三服效驗

牛郎頂牛郎丸

治氣藥

奔衝不可忍魚追蟲取積亦治水腫

黑牽牛

炒五錢

檳榔

二錢五分為末每服一錢紫蘇湯送

下蟲積及水腫用酒下

青綠頂

治頑痰不化

石青

一兩

石綠

五錢

並水飛為末麴和丸豈菜大溫水

下十丸吐去痰一二碗不損人風痰卒中用生  
綠二乳細水化去石慢火熬乾取辰日辰時辰位  
脩合再研入麝香和糯米粉糊丸彈子大陰乾卒  
中每丸作二服薄荷酒研下餘風硃砂酒化下吐  
出青涎瀉下惡物大效小兒用銅綠研粉醋麪糊  
丸芡子大每服薄荷化酒水下一丸須臾吐涎如  
膠神效

硫黃頂 治腰痛如神

黑丑半生取頭末水和丸梧子大硫黃末為衣空

心鹽酒送下五十丸

玉環來笑丹

治疝氣癰腫並諸氣腫痛

荔子核

四十粒

陳皮

連白

錠硫

黃

錢四

為末

鹽水

打麵

糊

丸萊豆大痛時空心酒服九丸良久再服不過三

服神效

黑鹽丸

鹽一升納粗瓷瓶中實築泥頭初以塘火燒漸；  
加炭火勿令瓶破候赤徹鹽如水泔即去火待凝  
破瓶取出豉一升熬煎桃仁一兩和麩炒熟巴豆

熟即小力生又損人四物搗勻入蜜丸梧子大每服三丸平旦時服天行時氣豉汁及茶送下心痛酒送下入口便止血痢飲下初變水痢後便止鬼瘡茶飲下骨蒸蜜湯下忌久冷漿水合藥久則稍加之凡服藥後吐利勿怪吐利若多服黃連泮止之或遇殺藥人藥久不動者更服一兩丸藥後忌口二三日其藥臘月合之瓷瓶密封勿令洩氣一劑可救百人或在道途村落無藥可求但用此藥

頂藥

八

即敵大黃朴消數兩曾用有效小兒女子不可服  
被攪作也

輕粉頂 治小兒涎喘

無雄雞子一個取清入輕粉抄一分拌勻和銀器  
盛置湯瓶上蒸熟三歲兒食盡當吐痰或泄而愈  
實者乃可用

羊英頂 治骨蒸傳尸

羊肉一拳大煮熟皂莢一個炙以無灰酒一升銅  
鐺內煮三五沸去渣入黑錫一兩令病人先啜肉

汁乃服一合當吐蟲如馬尾為效

截瘧頂 治三日大瘧

活大烏龜一个連殼左右肩上各攢一孔近尾處亦攢一孔以明雄黃九錢研細每孔糝入三錢外以甕黃泥包固勿令泄氣炭火上煨存性研細每服一錢空心陳酒送下二三服即止

又方 陳香櫟一只去頂皮大者每只加明雄黃三錢中者二錢小者一錢研細糝入香櫟內炭火中煨存性再研極細末每服七分用腐衣分作六七

頂藥

九

包乾咽下此日不可喫湯水任其嘔去頑痰即愈

三奇頂 治小兒天哮神效

經霜天燭子臘梅花各三錢水蛭一條俱水煎服

一劑即愈

金線頂 凡一切要吐痰涎之症用代尿蒂最妙

金線重接

俗名金線蠅蟻

用石槌打碎勿犯鐵

器晒乾為末小瓶收貯用之治風痰結胃取一

錢陰陽水和服吐去痰即愈傷食成瘧臨發時空

心水和服一錢吐即愈噤口痢疾涼水和服一錢

即愈

砒霜頂

治哮喘三年後可用

精豬肉

三十兩切信一兩研細末拌在肉上令白作骰子塊信勻用紙筋黃泥包之令乾

炭火于無人處煨青烟出盡為度研細以湯浸蒸

餅丸如菜豆大食前茶湯送下大人二十粒小兒

四五丸量虛實與之

齆喘痰積 凡天雨便發坐卧不得飲食不進乃

肺竅久積冷痰遇陰氣觸動則發也用此一服即愈服至七八次即出惡痰數升藥性亦隨而出即



斷根矣

江西淡豆豉

一兩蒸搗如泥入

砒霜末

一錢

枯礬

二錢

菜豆

大每用冷茶冷水送下七丸甚者九丸小兒五丸

即高枕仰卧忌食熱物等

皂礬頭

散稀涎

凡人率中風昏

如醉形體不收或倒

或不倒或口角流涎斯須不治便成大病此證風

涎潮于上胸痺氣不通用此吐之

皂莢末

兩一生

礬末

兩半

臘粉

兩半

水調

一二錢

過咽

即

吐涎用礬者膈下涎也

碧霞丹 凡中風痰厥癰瘡驚風痰涎上壅牙關緊

急土視搐搦並宜主之

烏頭尖

附子尖

蝎稍

各七十个

石綠

研幾度飛過十兩

為

細末麴糊丸芡子大每用一丸薄荷汁半盞化下  
更服溫酒半合須臾吐出痰涎為妙小兒驚癇加

白僵蠶等分

吐蠱

人頭面上有光它人手近之如火熾者此中

蠱也

蒜汁兩半

和酒服之當吐出如蛇

串雅內編 卷三

瓜蒂散

治痰涎頭目濕氣皮膚水疽濕熱諸症

瓜蒂

二錢半

熬黃赤小豆

二錢五分

為末每用一錢以香

豉一合熱湯七合煮糜去渣和服少少加快吐乃

止

風癰喉風咳嗽及遍身風疹急中涎潮等症不拘  
大小此藥不大吐逆只出涎水

瓜蒂為末壯年服一壹字老少半字早晨井水下

一食頃含沙糖一塊良久涎如水出年深者出黑  
涎有塊布水上也涎盡食粥一兩日如吐多人困

甚取麝香泡湯一盞飲之即止宜吐之症必須看光者放心吐之餘則皆忌亮者如蝸牛之涎一  
樣光亮也但看見光亮者無論其痰上中下此光  
亮之色必須俟其痰積乾而分辦之  
不可據其濕痰時而即以為光亮也

倒頑痰法 治痰結胃中不能吐出狂言如見鬼狀  
時發時止氣塞胃肝

牛肉五斤水二斗煎湯飲之至不可食而止以鵝  
翎探吐必吐至黃色頑痰而止前病頓失後以陳  
皮茯苓甘草白朮湯徐徐飲之平復如故

陰陽湯 治凡有上焦欲吐而不能吐者

滾水涼水各一碗均之加炒鹽一撮打百餘下起  
泡飲之立吐而愈

牛即串

丹過仙

治邪熱上攻痰涎壅滯胃吐食十膈

五噎噎哈酒積蟲積血積氣塊諸般痞積瘡熱腫

或大小便不利婦人女子面色痿黃鬼產癰瘕食

吞銅鐵銀物患皆治之五更冷茶送下三錢天明

可看去後之物此藥有疾去疾有蟲去蟲不傷元

氣臟腑小兒減半孕婦忌服

白牽牛頭末

四兩五錢半炒半生

白檳榔

一兩茵陳

錢蓬朮

醋三棱

五錢煮

牙皂

五錢去皮

串藥

十三

右共為末醋糊為丸如菜豆大依前數服行後隨以溫粥補之忌食他物

椰霜串

必勝散

治遠年近日大麻風症癩瘡三服即愈

大黃

栴榔

白牽牛

各五錢

粉霜

各五錢

各為細末分

作三服用生薑

四兩

絞汁入沙糖半酒盞水調勻于

晚臨睡腹中稍空卧床上服之至三更遍身手足

俱麻木如針刺頭目齒縫俱痛此藥尋病之功取

下二便或青或白或黑或黃或紅蟲之類此乃病

根也二十日內服三次漸痊眉毛鬚髮俱生肌膚

如舊或齒縫出血漱齒藥列于後

漱藥

貫仲

錢五

黃連

錢五

為末用水一鐘煎四五沸

入冰片少許攪勻漱口每日一服煎漱忌動風油

膩之物一月愈

黃甲串

散偷刀

治橫痃便毒未成者內消已成者膿從

大便下

生大黃

錢二

白芷

錢二

穿山甲

錢二

煨存性為末服三錢

空心酒送下

巴豆串

治痢疾



蒼朮

十二兩取堅白者米泔水浸一宿去毛皮

陳皮

十二兩

厚朴

十二兩姜汁炒

蓬朮

六兩歸身

六兩枳殼

八兩木通

連

八兩土黃連

一

三稜

六兩

木香

五錢

天竺黃

五錢

陳米

半

巴豆

四百粒

同炒黃色為

度揀去

豆不用

共煎藥為末和勻每服一錢二錢三錢視

病之輕重空心午後晚每日三服忌口生冷油膩

滑腸之物茶水忌之紅色甘草湯下

送下

白色姜湯送下

氣滯木香湯送下

紅白相兼

甘草姜湯送下

噤口人參白朮湯送下

無極丸

治男女諸病婦人經血不通赤白帶下山崩

漏不止腸風下血五淋產後積血癰瘕腹痛男子  
五勞七傷小兒骨蒸潮熱其效甚速宜六癸日合  
大黃一分作四分一分用童便一碗食鹽二錢浸  
一日切晒一分用醇酒一碗浸一日切晒再以巴  
豆仁三十五粒同炒金黃去豆不用一分用紅花  
四兩泡水一碗浸一日切晒一分用當歸四兩又  
淡醋一碗同浸一日去當歸切晒為末煉蜜為丸  
梧子大每服五十丸空心溫酒下取下惡物為驗  
未下再服

脩急丸 治心腹諸疾卒暴百病

大黃

巴豆

乾薑

各一兩

搗篩蜜和丸

小豆大每

服一丸凡中客忤心腹脹滿痛如錐刀氣急口噤  
卒死以暖水或酒服之或灌之未知更服三丸腹  
中鳴轉以吐下便愈若口已噤者灌之即瘥

烏龍串

一粒金丹  
名提虎丹

又治風寒暑濕脚氣不問遠年

近日一切走注疼痛不可忍臨發時空心服一丸  
趕到足面上赤腫痛不散再服一丸趕至脚心中  
出黑汗乃除根如病在上食後臨卧酒送下自然

汗出定痛為瘡驗中風癱瘓麻痺不仁手足不能

屈伸偏枯酒下二丸初中風不醒人事牙關不開

研一丸酒調灌下本驗

白膠香研草烏去皮五靈脂地龍去土木鱉子去油

各一兩乳香沒藥當歸各七錢五分麝香二錢五分京

酒燒酒浸五錢共為末和勻粘米粉為丸芡實大

溫酒研化一丸神效

輕粉串治小兒喫泥

輕粉分砂糖和丸麻子大空心米飲下一丸良久

京下餘字

泄出泥土瘰

犀黃串

辟瘴明目

升麻

犀角

黃苓

朴硝

梔子

大黃

各一兩

豉二升微熬同搗末蜜丸梧子大覺四肢大熱大便難即服三十丸取利為度四肢小熱只食後服二十丸非但辟瘴甚能明目

天一水串

白飛霞製通利水道

燈心

澄一斤

米粉

漿染

晒乾

研末

入水

赤白茯苓

皮去

共五

滑石

水飛

猪苓

二兩

澤瀉

三兩

人參

一斤切

兩

五

滑石

水飛

猪苓

二兩

澤瀉

三兩

人參

一斤切

片熬膏

片熬膏

片熬膏

片熬膏

片熬膏

片熬膏

片熬膏

片熬膏

右藥為丸如龍眼大硃砂為衣每用一九任病換引大段小兒生理向上本天一生水之妙諸病以水道通利為捷徑也

牽牛串 治男婦五般積氣成聚

黑牽牛一斤生搗末八兩餘滓以新瓦炒香再搗取四兩蜜丸如梧子大至重者三十五丸陳皮生姜煎湯卧時服半夜未動再服三十丸當下積聚之物尋常行氣每服十丸妙

禹功散 治諸水飲病

串雅內編 卷三

二

黑牽牛頭末四兩茴香一兩炒為末每服一二錢  
以生姜自然汁調下當轉下氣也

雙牛串齊世散治一切瘡疽發背無名腫毒年少氣壯

者

黑白牽牛各一合布色槌碎以好醋碗熬至八分露一夜

次日五更溫服以大便出膿血為妙

龍腦串 治痘瘡黑靨

生豬油半一椀龍腦半溫酒和服

又方 用獾猪第二番血清半盞酒半杯和勻入龍

腦分溫服良久利下瘀血一二行瘡即紅活醫所  
不治百發百中

五香串 治腹心氣脅痞積一切痛症立效

沉香

丁香

木香

檀香

乳香

去油

巴豆

霜各

錢大黃

甘草

鬱金

蒼朮

五靈脂

陳皮

厚朴

雄黃

各五錢

豆蔻

肉桂

共研

為細末

醋糊為

丸梧子大硃砂二錢為衣每服五丸重者七丸九

丸或至十一丸搥取單數勿雙空心熱酒送下忌

生冷物油膩等



車螯串

名轉毒散

治發背癰瘡

瘡

不問淺深大小利去病根

則免傳變此日華方

車螯

即蜃蟻背紫光厚者以鹽泥固濟煨赤出火毒一兩

生甘艸末一錢

輕

粉

五

為末每服四錢用梧樓一个酒二盞煎一盞

調服五更轉下惡物為度未下再服甚者不過二服

又方

車螯

仁

黃泥固濟煨赤出毒研末燈心

三十莖

梧樓

一个取仁炒香

甘草節

炒二錢

通作一服將三味入酒

入酒

二盞煎半盞去滓

入蜂蜜

一是調

車螯末二錢膩

粉少許空心溫服下惡涎毒為度

八寶串

消臟至神湯

臟脹經年而不死者非水脹乃氣臟

血臟食臟蟲臟也但得小便利而胃口未敗開者即可

治

茯苓

五兩人參

一兩雷丸

錢甘草

錢蘿蔔子

一兩白朮

錢五

大黃

一兩附子

錢水十碗煎湯

二碗早服

一盃必然

腹內雷鳴少頃必下惡物滿桶急拿出傾去再換

桶即以第二碗繼之又大瀉大下至黃昏而止淡

米湯飲之不再瀉然人弱極矣以人參錢茯苓

錢五

串雅內編 卷三

薏仁一兩山藥四錢陳皮五錢白芥子一錢水煎服一劑即愈忌食鹽者一月犯則無生機矣先須斷明然後用藥治之

瀉腋氣

精猪肉二大斤以甘遂二兩拌之夾腋下至天明以生甘草一兩煎湯飲之良久瀉出穢物須在荒野處恐穢氣傳人三五次即愈虛弱者間日為之

腹脅痞塊

雄黃一兩白礬一兩為末麪糊調膏攤貼未效再貼

大便數百斤之狀乃愈

發背初起

疑似者以秦艽牛乳煎服得快利三五行即愈

逐黃散

治小兒黃疸眼黃脾熱

瓜蒌

焙炒研

每服一錢水半升煎七分卧時服

瀉下黃物立可

絞腸痧

馬糞

一兩炒黑

入黃土一撮

微炒

黃酒乘熱服

錢五

一劑即

痛去如失非吐即瀉氣一通而痛定矣

單方

總治門

金液丹 治男子腎久冷心腹積聚脇下冷痛腹  
中諸蟲失精遺尿形羸力劣腰膝痛弱冷風頑痺  
上氣衄血欬逆寒熱霍亂轉筋虛滑下利又痔瘻  
濕蟲生瘡下血不止及婦人血結寒熱陰蝕疽痔  
用硫黃<sup>兩十</sup>研末用瓷盒盛以水和赤石脂封口鹽  
泥固濟日乾地內堽埋一小罐盛水令滿安盒內  
用泥固濟慢火養七日七夜候足加頂炭一斤煨

俟冷取出研末每一兩用蒸餅一兩水浸為丸如  
梧子大每服三十九侵晨空心米飲下又治傷寒  
身冷脉微或吐或利或自汗不止或小便不禁併  
宜之身熱脉出為度

煖益膏膝

硫黃斤半桑柴灰斗五淋取汁煮三伏時以鐵匙抄于  
火上試之伏火即止候乾以大火煨之如未伏更  
煮以伏為度煨了研末穿地坑一尺二寸投水于  
中待水清取和硫黃末坩鍋內煎如膏鐵鏟抄出

細研飯丸麻子大每空心鹽湯服十丸極有效驗  
都梁丸 治頭風眩暈女人胎前產後頭痛傷風皆  
效

香白芷一味為末洗晒不  
見火蜜丸彈子大每嚼一丸  
以清茶或荊芥化下

白虎丸 治痧症初覺頭疼惡心遍身腹腰作痛  
不思飲食即進一服當時青筋血散若過三五日  
青筋已老多服取效南名痧症北名青筋此藥能  
順氣下血化痰消滯又治心腹痛崩漏帶下久患

赤白痢疾打撲內傷血不能散或因氣腦致病服  
之神效

千年石灰洗淨刮去垢為末水飛過晒畧乾量可  
丸如梧子大每服五十丸看輕重加減燒酒送下